

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl

8 Exemplares no Parque



Família

Rosaceae

Nome Comum

nespereira, nespereira-do-Japão, nêspero

Origem

Sudeste da China, sendo todas as espécies do género *Eriobotrya* (cerca de 10) endêmicas do este da Ásia. Naturalizada no Japão.

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

(Thunb.) Lindl

Descrição

A nespereira é uma [árvore](#) com até 10 m de altura, de [copa](#) ampla e [irregular](#), densa e [ritidoma escamoso](#); rebentos grossos, [tomentoso-lanosos](#) e [tronco](#) sinuoso. As folhas são perenes, [simples](#) e inteiras ou ligeiramente dentadas, com 12 a 25 cm, [obovado-lanceoladas](#) a [elíptico-oblongas](#), [verde-escuras](#) na [página](#) superior e densamente arruivado-tomentosas na inferior, curtamente pecioladas e dispostas no extremo dos ramos, alternas ou opostas, com as nervuras bem evidentes. As inflorescências estão dispostas em panículas terminais, densamente arruivado-tomentosa, muito perfumadas; as sépalas são persistentes; as pétalas são brancas e onduladas. Possui numerosos estames (20) e [ovário ínfero](#). O fruto é um [pomo](#) (nêspera), com 2 a 6 cm, [piriforme](#) ou elipsóide, amarelo, coroado pelas sépalas, com poucas sementes, grandes e castanhas de 1 a 1,5 cm.

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[árvore](#)

Início de Floração

outubro

Fim de Floração

fevereiro

Tipo de Fruto

pomo

Consistência do Fruto

carnudo

Maturação do Fruto

abril

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

panícula

(inflorescência composta racemosa, de forma geralmente cônica ou piramidal, isto é, mais larga na base.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

oblongo-lanceolado

(limbo largamente lanceolado.)

Habitat

Ocorre em terrenos de textura leves, frequentemente arenosos.

Observações

A nespereira é uma árvore de fruto, outrora muito apreciada, dissemina-se através das sementes, e nas variedades hortícolas, por enxertia ou estacaria. De crescimento rápido, é uma árvore pouco exigente quanto a requisitos de terreno e clima. Desenvolve-se bem em lugares luminosos, tolera as geadas e períodos prolongados de secura.

O nome genérico deriva das palavras gregas *erion* (lã) e *botrys* (cacho de uvas), alusivo à disposição das flores e frutos em panículas e a presença de pelos. É interessante verificar que embora a sua origem seja a China, o restritivo específico é *japonica*, de facto é uma espécie naturalizada no Japão, onde está muito difundida.

Aplicações

De grande valor ornamental por possuir rápido crescimento e pela folhagem perene densa, escura e brilhante, e pela produção de frutos, de sabor agradável, que se comem frescos ou secos. Das sementes da nêspereira prepara-se um licor especial de mesa com sabor a amêndoas. Em medicina tradicional apreciam-se os frutos pelas suas propriedades moderadamente laxantes. As folhas cozidas aplicam-se em casos de diarreias e cólicas estomacais. A madeira, sem importância comercial, é muito dura, sendo por vezes usada em artesanato ou para fabricar instrumentos musicais.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

