

## *Rhododendron ponticum* L.

5 Exemplares no Parque



## Família

Ericaceae

## Nome Comum

adelfeira, rododendro

## Origem

Europa (sudoeste da Península Ibérica).

## Tipo de Origem

autóctone

## Autor

L.

## Descrição

Arbusto perenifólio, com 3 m de altura. Tronco ereto com casca lisa, cinzenta ou avermelhada e ramos dispostos mais ou menos horizontalmente. Apresenta folhas simples, glabras, elíptico-lanceoladas, com 7 a 15 cm de comprimento, coriáceas, de cor verde-escura brilhante na página superior e mais claras na inferior. Inflorescências corimbosas com 8 a 16 flores hermafroditas, pediceladas, cálice com cerca de 2 cm e corola simpétala, campanulada e afunilada, com 4 a 6 cm de comprimento, com 5 grandes lóbulos e cor violáceo-purpúrea, por vezes rosada. Os estames em número de 10 apresentam filetes esbranquiçados, ligeiramente arqueados. O gineceu possui um ovário e estilete glabros, sendo este último também excerto. O fruto é uma cápsula cilíndrica, com até 3 cm, que se abre por 5 valvas que encerram minúsculas sementes.

## Tipo de Reprodução

hermafrodita

## Forma de Vida

arbusto

## Início de Floração

março

## Fim de Floração

junho

## Tipo de Fruto

cápsula

## **Consistência do Fruto**

seco

## **Maturação do Fruto**

junho

## **Perenidade**

perenifólia

## **Inflorescência**

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também pode ser simples ou composto.)

## **Cor da Flor**

cor de rosa

## **Tipo de Folha**

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## **Inserção de Folha**

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

## **Margem da Folha**

inteira

(com a margem não recortada.)

## **Limbo da Folha**

elíptico

(contorno elíptico, de comprimento 2-3 vezes a largura, diminuindo do meio igualmente para os extremos.)

## **Habitat**

Ocorre naturalmente em bosques muito húmidos, próximo de linhas de água ou na periferia de bosques caducifólias.


## Observações

São plantas muito tóxicas, quer para o Homem, quer para a maioria dos animais (especialmente, os herbívoros), por produzirem andromedotoxina, um álcool tetracíclico, que tem um efeito profundo a nível do [sistema](#) cardiovascular e respiratório. Esta toxicidade também pode passar ao mel de adelfeira.

## Aplicações

O género *Rhododendron* é [cultivado](#) como [ornamental](#) em parques e jardins. A subespécie *baeticum* surge naturalmente, no centro e sul de Portugal continental, como por exemplo na Reserva Botânica do Cambarinho, na Serra do Caramulo. Pode apresentar carácter invasor em determinados países, fora da sua distribuição [natural](#), como é o caso do Reino Unido. Apresenta elevado interesse científico, por ser considerada uma relíquia da [flora](#) do período terciário ([Laurissilva](#)).

## Porte





## Folha



Flor





**Fruto**



## Tronco

